

Floribunda

Ültetési távolság: A nagytermetű floribundák 60 cm sor-, 30 cm tőtávra, a kistermetű floribundák 40 cm sor-, 30 cm tőtávolságra legyenek ültetéskor. Metszés: A metszés ideje február vége, április közepe, de esetleg a tél elején is elvégezhetjük ezt a műveletet.

Általános szabály, hogy 3-4 vágást hagyunk, hajtásonként 6-8 szemmel.

Metsző ollónk mindig éles legyen. Metszeni mindig ferdén, közvetlenül 5-10 mm-rel a rügy felett kell úgy, hogy a rügy mindig a metszés magasabbik oldalán legyen.

A legfelső rügy mindig arra nézzen amerre az új hajtást nevelni akarjuk.

A vadhajtásokat és az előregedett ágakat tőlük távolítsuk el.

A sérült beteg hajtásokat távolítsuk el.

A bokor közepén levő vagy befelé növekvő vesszőket vágjuk ki, a bokrokat ez által tegyük szellőssé.

Az idősebb ágak lefűrészelése után a metszfelületet kenjük be fesebkező anyaggal.

Metszés után a levágott ágakat eltávolítjuk és a töveket lemosásszerűen permetezzük pl. mészkénlével vagy Neopollal. Nyáron is használjuk a metsző ollót. A tenyészidő folyamán rendszeresen, 6-8 hetente távolítsuk el tőlük a vadhajtásokat. A laza szövetű vízhajtásokat és a vakhajtásokat (amelyek nem nevelnek bimbót) a hajtás közepéig vágjuk vissza.

Általános szabályként vegyük, hogy nyári visszavágáskor a virágtól lefelé haladva a második 5 levélből álló levél felett vágjuk vissza a hajtásokat. Ha vágást szedünk le virágot, úgy alulról felfelé haladva a második 5 levélből álló levél fölött vágjuk le a hajtást. Öntözés: Az időjárástól függően 8-12 naponta 20-30 l/m² vízzel locsoljuk meg rózsáinkat.

Lehetőleg reggelente és árasztásos módszerrel locsoljunk. Minden harmadik öntözés előtt szórjuk ki a fejtrágyázásra szánt műtrágyát. Tápanyag utánpótlás: Tápanyag utánpótlásra az ültetés évében nincs szükség. A második évtől dolgozzunk a talajba négyzetméterenként 5-10 kg istállótrágyát. Ügyeljünk arra, hogy csak érett trágyát használjunk,

mert a trágya korhadó részei a hajsálgyökereket károsítja. A komposztot is meg hálálja a rózsák. Szerves trágya mellett műtrágyát is kell használnunk. Fejtrágyaként négyzetméterenként 8-10 dkg komplex műtrágyát adjunk.

Tapasztalataim szerint kiváló a Voldünger, ez ugyan is, az alapelemek mellett mikroelemeket is tartalmaz. Akár kiszórva, akár vízben feloldva használhatjuk. A tápanyag utánpótlást levéltrágyázással is segíthetjük, 2-3 hetente 0,5 %-os Wuxal- vagy Voldünger-oldatos permetezéssel. A tenyészidőszak alatt többször, ahogy a talaj és a gyomosodás megkívánja, gyomtalanító kapálást iktassunk be. A talaj nedvességének megővése érdekében minden nagyobb esőzés vagy alapos öntözés után lazítsuk meg talajunkat kézi kultivátorral, ritka fogú gereblyével vagy visszahajtott szárú vasvillával.

Téli ápolás: A rózsatöveket késő ősszel földdel felkupacoljuk olyan magasan, hogy a szemzés fölött 15-20 cm magasságban takarja a föld. Takarás előtt a föld alá kerülő hajtásokat lombtalanítsuk, a leszedett lombot távolítsuk el. Ha a rózsatövek magasra nőttek, egyharmad részüket vágjuk vissza.