

## Polyanta/Polianta/

Ültetési távolság: A polyantha rózsatövek 40 cm sor-, 30 cm tőtávolságra kerüljenek egymástól az ültetés során.

Metszés: A metszés ideje február vége, április közepe, de esetleg a tél elején is elvégezhetjük ezt a műveletet.

A polyantha rózsatöveknél az előző évi virágzás maradványait metsszük le a legfelső 1-2 rüggyel együtt.

Metsző ollónk mindig éles legyen. Metszeni mindig ferdén, közvetlenül 5-10 mm-rel a rügy felett kell úgy, hogy a rügy mindig a metszés magasabbik oldalán legyen.

A legfelső rügy mindig arra nézzen amerre az új hajtást nevelni akarjuk.

A vadhajtásokat és az elöregedett ágakat töből távolítsuk el.

A sérült beteg hajtásokat távolítsuk el.

A bokor közepén levő vagy befele növevő vesszőket vágjuk ki, a bokrokat ez által tegyük szellőssé.

Az idősebb ágak lefűrészelése után a metszfelületet kenjük be fasebkezelő anyaggal.

Metszés után a levágott ágakat eltávolítjuk és a töveket lemosásszerűen permetezzük pl. mészkénlével vagy Neopollal. Nyáron is használjuk a metsző ollót. A tenyészidő folyamán rendszeresen, 6-8 hetente távolítsuk el töből a vadhajtásokat. A laza szövetű vízhajtásokat és a vakhajtásokat (amelyek nem nevelnek bimbót) a hajtás közepéig vágjuk vissza. Az erős növekedésű fajtáknál az elnyílt virágbuga alatt vágjunk vissza. Vannak öntisztuló fajták, ahol a virágkocsány magától lehullik. Öntözés:

Az időjárástól függően 8-12 naponta 20-30 l/m<sup>2</sup> vízzel locsoljuk meg rózsáinkat. Lehetőleg reggelente és árasztásos módszerrel locsoljunk. Minden harmadik öntözés előtt szórjuk ki a fejtrágyázásra szánt műtrágyát. Tápanyag utánpótlás: Tápanyag utánpótlásra az ültetés évében nincs szükség. A második évtől dolgozzunk a talajba négyzetméterenként 5-10 kg istállótrágyát. Ügyeljünk arra, hogy csak érett trágyát használjunk, mert a trágya korhadó részei a hajszályököket károsítja. A komposztot is meg hálálja a rózsza. Szerves trágya mellett műtrágyát is kell használnunk. Fejtrágyaként négyzetméterenként 8-10 dkg komplex műtrágyát adjunk. Tapasztalataim szerint kiváló a Voldünger, ez ugyan is, az alapelemeken kívül mikroelemeket is tartalmaz. Akár kiszórva, akár vízben feloldva használhatjuk. A tápanyag utánpótlást levéltrágyázással is segíthetjük, 2-3 hetente 0,5 %-os Wuxal- vagy Voldünger-oldatos permetezéssel. A tenyészidőszak alatt többször, ahogy a talaj és a gyomosodás megkívánja, gyomtalanító kapálást iktassunk be. A talaj nedvességének megóvására minden nagyobb esőzés vagy alapos öntözés után lazítsuk meg talajunkat kézi kultivátorral, ritka fogú gereblyével vagy visszahajtott szárú vasvillával. Téli ápolás: A rózsatöveket késő ősszel földdel felkupacoljuk olyan magasan, hogy a szemzés fölött 15-20 cm magasságban takarja a föld. Takarás előtt a föld alá kerülő hajtásokat lombtalanítsuk, a leszedett lombot távolítsuk el. Ha a rózsatövek magasra nőttek, egyharmad részüket vágjuk vissza.